



Provint din America de Sud, zona Anzilor, din regiunile cu clima mai moderata. In Europa au fost adusi in secolul al XVI-lea de catre marinari olandezi. S-au raspandit repede pe acest continent, fiind prasiti in forme si marimi diferite. Indragiti atat in randul adultilor, cat si a copiilor, porcusorii de Guineea sunt animale usor de intretinut, blanzi si docili, fiind animale de companie potrivite pentru copii, se recomanda celor cu varsta de **peste** sase ani. Un porcisor traieste in medie 5-7 ani.

Vrem unul sau mai multi porcusori?

In genele acestor mici mamifere dragalase a ramas intiparit instinct social, **varianta domestica prefera si ea viata in grup. La aceste animale este importanta mentinerea contactului olfactiv si auditiv cu specia proprie.**

Daca vrem sa se simta bine, sa-i oferim un prieten. La doi porcusori combinatiile potrivite sunt:

♦Doi masculi: un adult cu un pui se va imprieteni repede, aici stabilindu-se o ierarhie naturala. Doi masculi adulti necesita un spatiu mai mare si hrana suficienta, pentru a nu se batte intre ei. Introducerea se va face pe un teren neutru, si la inceput vor fi monitorizati. Daca se inteleag bine, vor fi pusii intr-o cusca cu asternut curat (nemarcat), in caz contrar, pana se accepta, ei vor trebui separati, de preferat intr-o cusca comună, mare, despartita cu o gratie la mijloc.

♦Doua femele: in general este cea mai potrivita alegere, foarte rar se respinge.

♦O femela cu un mascul - se vor intelege bine, dar in acest caz, daca nu suntem bine informati, ne putem astepta la multi pui. Nerespectand anumite reguli vom periclitata sanatatea - sau chiar si viata - femelei.

-In general puii de femela ajung la pubertate la varsta de 35 zile (!), iar puii masculi la varsta de 60 (!) zile. **La varsta de 4 saptamani ei trebuie separati pe sexe**, doar puii de femela pot ramane langa mama lor.

- Femela este recomandata ptr. reproducere la varsta de 5-6 luni. Pana la varsta de 8-10 luni ea poate fi selectionata ptr. monta, insa **daca pana la varsta de 1 an nu a nascut, nu (!) se mai recomanda ptr. reproducere.**

- Dupa trecerea a 2 ore de la nastere femela **va avea** din nou **ovulatie**, ea va deveni din nou gestanta, daca masculul ramane langa ea. Gestatiile des repeatate sunt daunatoare

sanatatii femelei. Dupa intarcarea puilor ea se va lasa sa se odihneasca - se va separa de mascul - cel putin 2-3 luni.

Nu vom tine niciodata doi sau mai multi masculi impreuna cu o femela. In prezența femelei/femelelor masculii vor fi adversari agresivi si se vor bate intre ei, provocandu-si ranii grave. In prezența femelei/femelelor masculii se vor bate chiar si in cazul in care unul/mai multi/totii dintre ei este/sunt castrati. Daca avem porcusor(i) in casa, se recomanda ca noul venit sa fie tinut aprox. 2-3 saptamani in carantina, in asa fel putem preintampina o eventuala imbolnavire.

Important! Sa nu asezam alte animale (iepuri, hamsteri etc.) langa porcusor(i), cerintele si nevoile lor sunt diferite.

Alegerea habitatului

Porcusorul de Guineea este sociabil, el se obisnuieste repede cu prezenta omului, cu zgomotele din casa, si devine prietenos. Cel mai bine se simte la temperatura camerei, la 16-20 °C. Vom tine cont de faptul, ca organismul lui e sensibil la variatiile mari si bruste ale temperaturii. Daca nu e tinut in locuinta, temperatura incaperii sa nu scada sub 10-12 °C. Sa fie ferit de curent si umezeala. Daca avem posibilitatea, sa-l tinem intr-o cusca mare, spatiala avand marimea de cel putin 80x60 cm (lungime/latime). Fundul custii trebuie sa fie plat, fara gauri sau gratii, piciorusul lui fiind sensibil/delicat. Acvariul sau custile tip acvariu nu sunt recomandate, in acestea nu circula bine aerul, fapt care poate provoca imbolnavirea porcusorului. Pe langa acestea el nu va percepe nici zgomotele exterioare, si va deveni mai fricos. In cazul in care dorim sa construim noi o cusca, nu vom folosi materiale ce ar putea fi daunatoare sanatatii lui, el va incerca sa le rontae.

Ca **asternut** se recomanda talas uscat care nu contine uleiuri aromatice. Talasul de cedru este toxic, nu se va folosi niciodata! Tot asa si aroma talasului de pin verde neuscat poate fi fatala, deoarece porcusorul este sensibil la mirosluri. In cazul necuratirii custii la timp gazele produse de urina pot pune si ele in pericol sanatatea porcusorului. Schimbarea asternutului se va face in functie de numarul animalelor, calitatea asternutului si marimea custii. Important! Rumegusul nu este un bun asternut, porcusorul va inhala praful de rumegus, si se va imbolnavi.

Porcusorii prefera sa se ascunda, o ascunzatoare/casuta in cusca va fi binevenita. In interiorul custii sau casutei putem pune un prosop mic, ei vor sta si vor dormi pe acesta. Le face placere sa inspecteze locuri noi, au nevoie de miscare. Daca avem posibilitatea, din cand in cand ii vom scoate din cusca, si ii vom lasa sa se plimbe pe un teren mai mare. Vom avea grija sa nu ajunga la fire electrice sau plante otravitoare. Pe timp favorabil, la o casa cu gradina, ei pot fi scosi in aer liber, la umbra, intr-un tarc la care nu pot ajunge animalele pradatoare.

Informatii detaliate la adresa

www.gemon.ro

© Copyright 2007 Mondovics Geda

Hranirea

Va avea acces permanent la **apa**. Este gresita ideea ca ei nu au nevoie de apa. Alegerea cea mai buna va fi adaptarea care se poate instala la marginea custii. In asa fel apa va ramane curata. Daca nu stie s-o foloseasca, in diferite perioade ale zilei ii vom atinge gura cu ciocul adaptarei, la atingere el va simti si/sau va linge apa. In cazul in care nu-i putem oferi adaptare, vom folosi un vas mai greu si gros pe care nu-l poate rasturna.

In dieta lui accentul va fi pe **fan si verdeturi**. Fanul are un rol deosebit in digestia porcusorului, mentionandu-l sanatos. Rontand fanul isi va putea tocii si dintii care sunt in permanenta crestere.

Hrana speciala ptr. porcusori nu poate inlocui fanul, oricare tip de hrana speciala ar consuma, **fanul va fi permanent (!)** in fata lui. Pe langa fanul de iarbă se poate da fan de trifoi/orz/ovaz etc. Fanul de lucerna se va da mai rar, contine mult calciu, consumarea lui exagerata poate avea ca rezultat depunerea calciului in rinichi. Organismul porcusorul, ca si al omului, nu poate sintetiza **Vitamina C**, este nevoie de introducerea ei print-o hranire corespunzatoare. Pentru a evita scorbutul, porcusorul va primi zilnic iarbă verde proaspata. Diferitele verdeturi, legume, fructe sunt si ele recomandate in hrana zilnica. Ratia zilnica necesara al unui porcusor adult este de aprox. 10 mg Vitamina C. Acest necesar este asigurat prin alimentatia naturala pe timpul verii. Iarbă va fi culerasa din zone nepoluate, departe de sosele si de locurile vizitate de Caini. Papadia, traista ciobanului, trifoiul salbatic, trifoiul, rocoina sunt si ele o alternativa in alimentatie. Putem rasofi si cartile cu plante medicinale, ne vor fi de ajutor in alegerea hranei diversificate. **Verdeturi, legume si fructe** mai des consumate de porcusori: castraveti, morcovii (si frunza), marar, sfecela rosie, rosii, frunza de patrunjel, frunza de gulii, gulii*, napi, sfecela furajera, frunza de broccoli, broccoli*, spanac, frunza de sfecela, frunza de conopida, conopida*, patrunjel, sparanghel, ardei gras, salata verde**, mazare frageda in pastaie, pastarnac, dovlecel, dovleac, mere, cirese, struguri, prune, portocale, kiwi, banane, mandarine, lubenita, piersici, nectarin, frunza de mustar, frunza de telina***, coaja frageda a stiuletei de porumb, varza*, andive, frunza verde si matasea frageda de porumb, frunza de ridichi, pepene etc.

Nota:

- * Atentie, in cantitati mari produc balonare.

- ** Se va da mai rar, in cantitati mari afecteaza rinichii.

- *** Se va da o cantitate mica. Tulpina groasa se va arunca, este greu de digerat.

- Fructele vor fi oferite fara samburi. Citricele se vor taia in cubulete mici, pentru a nu fi invelite in pielita. In acest fel porcusorii vor simti imediat gustul lor, si le vor consuma mai repede.

- Spanacul contine oxalat, nu se va da in cantitati mari, deoarece poate contribui la formarea pietrelor in rinichi.

- Toate legumele, verdeturile si fructele vor fi spalate, si **se va evita hranirea cu cele care au fost tratate cu diferite substante toxice (pesticide)**. Nu se vor da nuci, cartofi, si nici alimente iuti. El va fi hraniat **cat mai diversificat posibil**, in asa fel va obtine toate mineralele si vitaminele necesare organismului sau.

Iarna importanta vitaminei C devine si mai accentuata, in aceasta perioada verdeturile, legumele, fructele au un continut mai redus de vitamine. Vom tine cont de acest aspect, si ii vom oferi o dieta naturala cat mai bogata in vitamina C - uneori ii vom inculti si grau -, pentru a-l mentine sanatos. In cazul in care Vitamina C nu este inserata in cantitati suficiente in hrana, se va proceda la suplimentarea ei. Se va da odata pe saptamana, in functie de dieta consumata. Cea mai buna alegere e acidul ascorbic sub forma de pulbere sau comprimate, dizolvate in apa (eventual presarate pe hrana). Pentru aprecierea cantitatii vom cere sfatul medicului veterinar, tinand cont de continutul de vitamina din dieta sa si necesitatile lui, deoarece supradozarea poate provoca boala numita "pseudo-scorbut".

Important! In timpul gestatiei, lactatiei, in bolile infectioase si de piele nevoile de Vitamina C sunt crescute pana la dublu.

Semintele se vor amesteca in felul urmator: cea mai mare parte, aprox. 80 % va fi **ovaz** (!), iar restul de 20 % va fi un amestec de orz, grau, porumb si seminte de floarea soarelui. Cele doua din urma se vor da in cantitati f. mici din cauza continutului mare de grasimi si proteine. Semintele de floarea soarelui se vor da decojite, deoarece coaja lor poate intra intre dinti, sau poate provoca sufocarea porcisorului. Puilor, femelelor care alapteaza, si tineretului se vor da seminte in fiecare zi sau la doua zile odata, tinand cont de starea de dezvoltare, greutate etc. Porcisorii maturi si femelele gestante vor primi seminte doar de 2-3 ori pe saptamana, in asa fel ei nu se vor ingrasa. In general porcisorii au nevoie de multa verdeata, fan, legume si fructe. **Nefiind animale granivore** alimentele de baza la ei nu vor fi niciodata semintele de cereale! Daca avem posibilitatea de a le oferi **hrana granulata special conceputa pentru porcisorii** (cea din import), ei **nu vor avea nevoie de seminte**. In cazul in care hrana speciala o vor primi doar ocazional, aceasta se va da impreuna cu amestecul de cereale. Alimentele noi vor fi introduse treptat, pocusorii accepta mai greu (!) hrana pe care nu au consumat-o langa mama lor. Ocazional, dar mai rar le vom da si paine foarte uscata, o vor rontai cu placere.



Ingrijiri periodice

La porcisorii maturi **se vor verifica gherutele** odata la luna si **se vor taia varfurile**. Acestea nu se tocesc ca la cei salbatici. La piciorusele de culoare deschisa se vad venele din gherute, varful se va taia in asa fel, incat sa avem o distanta de aprox. 1,5 - 2 mm distanta de vena. La cei cu

picioruse de culoare inchisa nu se pot vedea venele din gherute, din aceasta cauza la acestia se vor taia mai putin, dar mai des din varfurii. Forma gherutelor trebuie respectata, vor fi taiate putin oblic, lasand partea de sus putin mai lunga. Daca accidental am tataiat in vena, vom spala acel loc cu putina apa oxigenata sau cu un alt dezinfector (Betadine), pentru a preintampina infectia. In general porcisorilor nu le place baia si nu este recomandata, deoarece samponul/sapunul indeparteaza grasimile naturale de pe pielea lor. **Baie** ii vom face doar daca este strict necesara. In acest caz vom folosi sampon slab (cel ptr. copii sau pisici), si nu-i vom uida capul. Vom fi atenti la ochi, nas si urechi, si-l vom usca foarte bine pentru a nu raci. Uscatorul de par vom tine mai departe de blana sau il vom regla pentru o temperatura mai scazuta, pielea lui fiind sensibila. Evitam pe cat posibil imbaierea puilor sub 2 luni, a femelelor gestante si a celor care alapteaza. Daca acest lucru nu este posibil, imbaierea la aceste categorii se va face fara sampon, sapun. Blana **o putem peria** zilnic. Acest lucru vom face cu multa rabdare la cei cu par lung.
Se verifica periodic si **dentitia**. Uneori, accidental, se poate rupe o bucată din incisiv (din dintele din fata). Daca mananca bine in continuare si este vioi, vizitarea medicului veterinar nu este necesita, deoarece incisivul va creste repede la lungimea potrivita. Corectarea (taierea) dintilor va fi necesara doar in cazul in care el nu va putea mesteca bine, refuza mancarea sau nu poate manca, are probleme la inghitire etc. Mai rar, incisivi, premolarii si/sau molarii pot creste prea lungi, impiedicand porcisorul in consumarea hranei, si/sau pot devine prea ascunzati, ranind limba porcisorului. In acest caz vom cere ajutorul medicului veterinar in cel mai scurt timp posibil (!), altfel el se va imbolnawi si va muri.

Important! Cand ridicam porcisorul, corpul lui va fi sustinut cu ajutorul ambelor maini!

Cum se joaca?

Un porcisor care este imblanzit devine foarte prietenos si ii va placea sa se plimbe si in afara custii. Pentru plimbare va fi potrivita bucataria, baia sau acele locuri unde dusumeaua se poate curata usor. Va fi mult mai vioi, daca poate avea un partener. Impreuna vor inspecta locurile noi, vor fugi prin incapere, se vor juca de-a v-ati ascunsele. Jucariile preferate vor fi cele in care se pot ascunde: un tub gros din carton in care pot circula fara probleme, labirinturi construite din ziare si/sau cartoane etc. Rola de carton de la mijlocul hartiei igienice, umpluta cu fan, este si ea buna pentru joaca. Daca cusca lor e spatioasa, in ea se pot pune tuburi groase, diferite ascunzatoare, hamac, pernute etc. Nu vom pune niciodata roata (cea ptr. hamsteri) sau minga de orice fel, ei nu se pot juca cu acestea. Cand se simt bine si sunt intr-o dispozitie foarte buna, ei sar in sus si schimba directia in timpul sariturii chiar si 180°, aterizand intr-o alta pozitie. Aceasta saritura in limba engleza se numeste saritura "pop-corn", deoarece ei sar ca florile de porumb. In aceasta perioada si mama lor devine mai jucuosa, de multe ori sarind impreuna cu puii sai.

Jucaria cea mai potrivita pentru un porcisor?
Un alt porcisor, cu care sa se poata juca!



Varianta gratuita
Se distribuie liber

La ce sa fim atenti?

O scarpinare mai deasă decat cea normală, caderea masiva a parului si/sau prezenta unor portiuni fara par sunt simptome care necesita ingrijiri medicale. La porcisori bolile de piele cele mai frecvente sunt dermatozele provocate de **paraziți animali** (acarieni, paduchi) sau **paraziți vegetali** (dermatofiti). Porcisorul va fi examinat de catre medicul veterinar, deoarece diagnosticarea poate fi dificila, simptomele in multe cazuri fiind asemănatoare.

Fiind erbivor, porcisorul isi petrece majoritatea zilei mancand, rontand. Inapetenta poate fi semnul diferitelor boli. Un porcisor este bolnav, daca dupa trecerea a 6-12 ore nu are interes fata de mancare. Este foarte important sa observam din timp simptomele de boala, **daca devine letargic si refuza hrana, el trebuie dus la medicul veterinar cat mai curand posibil** (!), deoarece dupa trecerea a 16-20 ore ficiatul lui va incepe sa se deterioreze, el se va simti tot mai rau, si fara tratament va muri.

Antibiotice care NU se vor administra niciodata (!) porcisorului, fiind toxice pentru el:

Penicilina in orice forma, Amoxicilina (Clavamox), Eritromicina, Lincocin (Lincomycin, Lincorex), Streptomicina, Dihidrostreptomicina, Clortetraciclina, Oxitetraciclina, Ampicilina, Cefalexin, Cefadroxil, Cefazolina, Clindamicina, Bacitracina, si derivatele acestora. Unele din aceste antibiotice actioneaza asupra florei intestinale si provoaca diaree ireversibila si fatala, altele provoaca o reactie alergica fatala.

Antibiotice care se pot administra porcisorului, respectand indicatiile medicului veterinar:

Baytril (Enrofloxacin) - se va administra numai adultilor, nu se va administra puilor sau porcisorilor care sunt in crestere

Bactrim (Tribissen, Septra, SMZ-TMP) - acest medicament se poate administra si celor in crestere

Cloramfenicol palmitat, Cloramfenicol succinat

Sulfametazin

Doxiciclină (Vibramicina, Vibravet) - se va evita utilizarea lui la femelele in ultimele 3 saptamani ale gestatiei, si la puii nou-nascuti in primele 4 saptamani de viata, deoarece cauzeaza colorarea permanenta a dintilor (galben-gri-brun) la pui.

Tetraciclina - se va folosi cu f. mare precautie (!), deoarece in unele carti/lucrari de specialitate **apare ca toxic** pentru porcisori.

In concluzie, porcisorul de Guineea va fi mai sensibil la boli, daca nu respectam cateva reguli de baza. Daca vom avea grija de el, il vom hrani si il vom ingrijii corect, dupa necesitatile lui, si **ii vom oferi si un partener** - de preferat de acelasi sex, - **impreuna se vor simti bine, si ne vor darui multe clipe fericite.**

