



Trusa pentru sanatatea porcisorului

Ca stapan de porcusori este extrem de util sa aveti in casa o trusa de prim ajutor pentru ingrijirea lor. Sunt cateva materiale ce sunt de dorit sa fie mereu la indemana, in acest fel puteti ajuta porcisorul in caz de urgenta **pana ajungeti la medicul veterinar**, totodata aveti posibilitatea de a intampina unele situatii patologice si de a trata diferite afectiuni minore, in faze incipiente.

➔ **Vitamina C**, comprimate de 180 sau 200 mg, sau in forma lichida: se administreaza suplimentar pe o perioada de 7-10 zile zilnic, de la 20-pana la 50 mg, in carenta de acid ascorbic, in boli infectioase si de piele, stres (in situatii de stres glanda suprarenala consuma o cantitate mai mare de acid ascorbic!), in perioada de gestatie, alaptare, inapetenta sau stare generala slaba, afectiuni dentare, la trecerea dintre iarna si primavara, in perioada de convalescenta.

Echilibrul florei intestinale a porcisorului este sensibil, poate fi usor perturbat de o dieta nepotrivita, alimentatie brusca schimbata si/sau saraca in fibre, stres, diferite infectii, tratament cu antibiotice etc. Este esential ca bacteriile protectoare ale florei sa fie protejate, porcisorul va avea acces permanent la fan. Flora endogena prezinta linia intai in apararea organismului impotriva infectiilor, are un rol esential in mentinerea imunitatii.

➔ **Probioticele** contin microorganisme care imbunatatesc echilibrul microbial al intestinului. Pentru a impiedica inmultirea bacteriilor patogene in intestine, pentru reglarea compozitiei microflorei endogene porcisorul bolnav, slab, inapetent si cel cu diferite probleme digestive va primi zilnic de 1-4x pe o perioada de 1-2 saptamani **Bio-Lapis, Laktiferm, Lactobacillus acidophilus, Biotics, Ecoflorina** sau alt supliment probiotic. 1 varf de cutit probiotic se amesteca cu putina apa ce nu contine clor (apa plata) adaugand apa treptat pana se obtine o pasta ce diluat cu inca putina apa se va administra porcisorului cu lingurita, sau celui hranit artificial in hrana preparata al acestuia. In cazul administrarii unui antibiotic prescris de medicul veterinar dupa 1-2 ore administrare medicament obligatoriu se va da probiotic pentru protejarea florei intestinale.

Important! Porcisorul de Guineea nu este capabil sa sintetizeze in organismul lui Vitamina C, el isi procura acest nutrient din surse exogene, din alimente (hrana, iarba verde, verdeturi, legume, fructe).

➔ **Carbunele medicinal** (Carbo activatus, Carbo medicinalis) este deosebit de util in cazul toxiinfectiilor alimentare, balonare, diaree, otravire. Avand o putere crescuta de adsorbție poate opri adsorbția substantelor toxice in tractul gastrointestinal. 100 mg carbune activ se dizolva cu apa si se da porcisorului cu ajutorul unei seringi, deschizandu-i gurita lateral dupa dintii incisivi. Important! Se va pastra un interval de doua ore intre administrare carbune activ si alt medicament.



➔ **Betadine solutie**, antiseptic cu spectru larg antimicrobial, cu efect bactericid, fungicid, virucid, protozoicid. Este un dezinfectant ce **nu trebuie sa lipseasca** din trusa de urgente, se poate folosi in diferite afectiuni cutanate, dermatite (inflamatii ale pielii), dermatoze micotice, bacteriene sau suprainfectate. Nu ustura, deoarece nu contine alcool.

➔ **Simeticone** (Espumisan, SAB SIMPLEX) - inhiba procesele fermentative, modifica si dezintegreaza baloanele mici de spuma ce se produc in intestine datorita acumularii gazelor. Se adm. de 2x/zi jumatarea dozei recomandate pt. copii.

➔ **Picaturi Beres Drops**

Plus: contin minerale si microelemente, se administreaza in cure, de la 10 pana la 30 zile, 1 sau 2 picaturi/zi **impreduna cu vitamina C** pentru intarirea sistemului imunitar, pentru cresterea apetitului, in stari de convalescenta dupa anumite boli parazitare sau altele, atunci cand dintr-un anumit motiv organismul este slabit.

➔ **Saruri pentru rehidratare orala (SRO):**

In diaree, inapetenta, febra, hipertermie, afectiuni respiratorii sau renale porcisorul se poate deshidrata. In acest caz **este necesara** compensarea pierderilor de electroliti prin administrare de saruri de rehidratare orala. In deshidratare severa ciupind usor pielea porcisorului aceasta nu isi revine la loc, pliul format de ciupitura persista. In acest caz se cere ajutorul medicului veterinar, el ii va administra rehidratant pe cale subcutanata.

Lipsa apetitului este un simptom ce poate aparea in multe afectiuni. Un porcisor care dupa trecerea a 6-12 ore nu are interes fata de hrana, este bolnav si trebuie dus cat mai curand la medic, deoarece dupa trecerea a 16-20 ore ficatul, cea mai mare glanda a aparatului digestiv va incepe sa se deterioreze si el se va simti tot mai rau. In perioada in care nu mananca singur, pe langa tratamentul prescris/aplicat de catre medicul veterinar el va trebui hranit de catre stapan cu ajutorul unei seringi sau cu o lingurita de aprox. 4-6 ori pe zi. La fel de importanta este si asigurarea unei cantitati adecvate de apa si lichide ce preintampina deshidratarea. Hranirea este o parte a procesului de vindecare, organismul primeste calorii, nutrienti, vitamine si minerale ce ajuta porcisorul slabit sa prinda puteri, sa lupte, si sa se refaca mai repede. In aceasta perioada el va fi pus pe un prosop sau paturica cald(a), pentru a se relaxa si a se simti mai bine.

➔ **Hrana preparata special** pentru hranire cu seringă/lingurita:

- 20 mg pelete de lucerna sau hrana speciala pentru porcusori se sfarama in rasnita de cafea sau se inmoaie in apa
 - o bucata/felie de mar si morcov ras la care la urmatoarele mese se adauga sau se inlocuiesc (cu) alte legume, verdeturi, plante med. marunt taiate
 - 1-2 lingurite de hrana vegetala tip baby-food cu fructe, mazare, morcovi
 - o lingurita tarata grau sau fulgi de ovaz
 - 1 fiola solutie glucoza, 10 mg vitamina C si un varf de cutit probiotic
 - in completare: solutie ionica cu actiune de rehidratare si reechilibrare hidroelectrolitica Ringer lactat, apa plata, sau ceafara zahar
- Restul se pastreaza la frigider max. 24 ore, portiile scoase se incalzesc putin.

La prima masa ii vom da aprox. 2-4 ml, dupa care treptat, in functie de stare si apetit vom mari cantitatea. Scopul nostru este sa manance singur, pentru asta il vom incuraja sa consume cat mai curand hrana cu inalt continut de fibre (fan, hrana speciala, legume, verdeturi, plante, fructe). Daca nu bea apa, dupa nevoi ii vom adm. lichide, apa.

Durerea este traita ca un stres intens ce slabeste si mai mult organismul porcisorului de Guineea, el refuza hrana atunci cand are dureri. Recuperarea este mult mai rapida atunci cand durerea este suprimata/atenuata cu un medicament calmant.



➔ **Seringi de 3-10 ml** pentru hranirea porcisorului

➔ **Seringa insulina** pentru administrare medicamente

➔ **Solutie oftalmica NAFA-GAL**, are proprietati decongestive si antialergice, este indicat in conjunctivite, iritatii conjunctivale. Se aplica o singura picatura/zi in sacul conjunctival al ochiului afectat. In cazul in care inflamatia conjunctivei oculare este insotita de secretii, cruste, alternativ, tot odata pe zi se poate aplica cu bune rezultate si **unguent oftalmic cu Kanamicina**, kanamicina avand o actiune bactericida cu spectru larg.

➔ In stari de inapetenta si anxietate se poate administra **una** dintre aceste medicamente:

- **Diazepam** (Valium) are actiune sedativa si relaxanta, stimuleaza apetitul si combate anxietate. Doza zilnica: 0,5-3 mg/kg, i.m. sau oral.
- **Ciproheptadina** cu efect sedativ si antiserotoninic stimuleaza/mareste apetitul. Se administreaza 1/8-ime comprimat (0,5 mg) de 2x/zi.

Analgezia preemptiva - initierea terapiei analgetice inainte de aparitia durerii, blocarea impulsurilor dureroase, infiltrarea locala cu anestezice locale cu durata mare de actiune face ca porcisorul sa se simta relaxat dupa interventia chirurgicala suferita, trecand mai repede peste perioada de convalescenta.

➔ **Buprenorphina** (Buprenex), medicament analgezic opiaceu, sintetic, f. puternic, cu timp de actiune de 6-8 ore. Doza: 0,05 mg/kg s.c/iv, la 8-12h, sau 0,05-0,1 mg/kg s.c, administrat postoperator, 1-2 zile.

- **Meloxicam** (Metacam, Mobic), antiinflamator nesteroidian, are efect analgezic si antipiretic, controleaza durerea. Doza zilnica este de 0,2 mg/kg, per os.

➔ **Sudafed**, actioneaza ca decongestiv la nivelul cailor respiratorii superioare, ajuta la eliberarea cailor nazale infundate datorita racelii si a altor probleme respiratorii. Se administreaza oral de 2x/zi, maxim 5 zile, doza zilnica (!) este de 0.4ml/zi, echivalent a 1,2 mg/zi. Porcisorul va fi tinut pe prosop cald, si se va pune si o sticla cu apa calda langa el.

➔ **Unguent galbenele** - are actiune antiinflamatoare, antiseptica, calmanta, cicatrizanta, epitelizanta. In diferite afectiuni cutanate se aplica pe zona afectata, este indicat si in inflamatii/iritatii la nivelul aparatului genital extern.

➔ **Unguent cu antibiotic - BNP** (cu triplu antibiotic, sulfat de polimixina-B, bacitracina zinc si sulfat de neomicina este extrem de eficace), **Neosoprina**, **Baneocin** sau un **alt unguent cu antibiotic**. In infectii bacteriene ale pielii de mica extindere, dermatite, eczeme, rani infectate. Dupa aplicare, pana la absorbirea produsului porcusorul va fi tinut in brate pentru a nu linge unguentul. Folosire prudenta in cazul femelelor gestante si a celor care alapteaza.

Exista o serie de conditii fiziologice si patologice care cresc necesarul de vitamina C. In infectiile de piele este f. important ca porcusorul de Guineea sa primeasca suplimentar timp de 7-10 zile zilnic 20-30 mg vitamina C, pentru a-i mari rezistenta organismului si pentru a grabi vindecarea.

➔ **Crema Nizoral** - se aplica topical pe pielea infectata cu ciuperci parazite, are o puternica actiune antimicotica. Alternativ se va folosi solutie Betadine, tratamentul se va continua cateva zile chiar si dupa vindecare, pentru a nu recidiva.

In cazul infectiilor fungice prezente pe o portiune mai mare se va folosi **sampon Nizoral**, odata pe saptamana 3 saptamani la rand. Samponul amestecat cu apa se lasa 3-5 minute pe piele/blana dupa care se clateste abundent cu apa curata. Alternativ se poate folosi si crema Nizoral. Cu acest sampon se poate dezinfecta si cusca, diferitele accesorii, pieaptanul etc. Castronasul de hrana si adapatoarea se dezinfecteaza numai cu apa cu otet! Se va mentine o igiena riguroasa.

➔ **Smecta** - pudra in plicuri pentru suspensie orala. Indicat in **diaree**, tulburari de tranzit intestinal.



Actioneaza ca mucoprotector, are proprietati adsorbante, fixeaza gazele digestive. Se administreaza un varf de cutit amestecat cu apa sau ceai fara zahar, de 2x/zi. Porcusorul cu diaree **va primi doar fan si lichide** (ceai de menta, apa, suc de morcov). Legumele fibroase, verdeturile se vor introduce treptat dupa restabilire scaun. In perioada afectiunii se va tine pe prosopel cald chiar si noaptea, si **se va rehidrata** in functie de necesitate pentru a evita deshidratarea.

➔ **Lubrifiant** pentru curatarea sacului anal al masculului: vaselina de la farmacie, sau ulei pentru copii. Cu **betisor vata** se curata cu delicatete sacul anal prealabil lubrifiat dinspre interior spre exterior de corpul strain (talas, altele) prezent in sac, sau in cazul constiparii de continutul rectului.

➔ **SH-Rodemectin spot on** (Beaphar Ivermectin Spot On sau Xeno 450 Spot-On), solutie pe baza de **Ivermectina pentru uz extern**. Are actiune antiparazitara, este eficace in infestari cu **acarieni localizati in blana, sub piele si in urechi**. Doza se va da in functie de greutatea porcusorului, **pentru aplicare topicala se va folosi 0,5 mg/kilocorp** (un porcusor de 1 kg va fi tratat topical cu 0,5 mg Ivermectina!). Se aplica pe portiunea fara par de dupa ureche, este absorbita prin tegument si are efect la nivelul intregului organism al porcusorului. Numarul de administrari depinde de tipul de parazit, in general se repeta de 1-2x la intervale de 7 zile, in cazul acarienilor de ureche dupa 18 zile.

➔ **Ivermectina** (Ivomec) aplicat **subcutanat** - pentru **eradicarea acarienilor Trixacarus caviae** (raie, parazit specific al porcusorului). Doza recomandata **pentru administrare subcutanata** este de **0,2 mg Ivermectina/kilocorp**, tratamentul se va repeta inca odata dupa 10 zile. Tratamentul se poate aplica si in cazul femelelor gestante, insa la puii cu greutatea corporala mai mica de 340 grame de preferat nu se va administra, in acest caz se va consulta medicul veterinar obligatoriu.

➔ **Advantage-40** (substanta activa Imidacloprid) - produs pentru combaterea puricilor la caini si pisici, este f. efectiv **in combaterea paduchilor la porcusori** in cazul in care este folosit in doza corecta (mg/kg corp). Advantage contine 91 mg/ml Imidacloprid, unui porcusor cu o greutate corporala de 1 kg se va aplica topical pe portiunea fara par de dupa ureche 0,24 ml, unuia cu o greutate corporala de 450 grame se va aplica topical 0,1 ml, doza putand fi usor masurata cu o seringa de unica folosinta pentru insulina. Pentru a nu gresi calcularea dozei, pentru a evita supradozarea, inainte de aplicare se va cere intotdeauna sfatul medicului veterinar. Acest produs se poate folosi si la femele gestante si pui recent intarcati. In cazul unei infectii provocate de acarieni produsul nu va avea efect!



Pentru monitorizarea dezvoltării fizice și a stării de sănătate a porcusorului de Guinee este util ca **cel sanatos sa fie cantarit** odata pe saptamana sau macar bisaptamanal, iar **cel bolnav zilnic**. Greutatea este una dintre unitatile de masura ale starii de sanatate, **o scadere brusca a greutatii indica o problema** ce descoperit din timp de catre stapan poate fi mult mai usor de tratat. Scaderea greutatii poate avea mai multe cauze, cea mai frecventa fiind malocluzia. De regula, daca un porcusor adult pierde in greutate de la o saptamana la alta aproximativ **50 de grame**, va fi mai indeaproape monitorizat - apetitul, comportamentul, urina, scaunul si starea generala. Daca intr-o saptamana scade **80 grame** sau mai mult (!), aceasta scadere poate fi un semn de boala, o problema dentara/bucala, consecinta unui factor stresant, o schimbare brusca (meniu, mediu, altceva) ce a cauzat aceasta scadere. In cazul in care scaderea de la o saptamana la alta este de **peste 100 de grame**, un consult medical, cat mai curand posibil, va fi absolut necesar!

Important! Excesul de greutate contribuie la cresterea riscului de dezvoltare a mai multor boli, **obezitatea** scade calitatea vietii. La hranire se va tine cont de starea si varsta porcusorului, se va oferi o dieta diversificata, bogata in fibre (fanul si apa mereu accesibile, iarba verde si/sau diversificat verdeturi, legume, fructe de 2-3x/zi, si hrana speciala in functie de stare fiziologica si varsta).

➔ **Lactat de calciu** - se va da numai in cazuri justificate, excesul de calciu poate duce la formarea pietrelor in rinichi! Doza alimente, introducand treptat in dieta si verdeturi, legume, fructe, hrana obisnuita de **25 mg/kg** se administreaza ca supliment in ultimele saptamani ale gestatiei, in perioada de alaptare, pierdere de calciu din oase, fiind eficace si in cazul in care porcusorul inexplicabil isi taraste piciorusele posterioare sau se deplaseaza cu acestea cu dificultate, fara sa fie ranit.

➔ **Produse necesare hranirii si ingrijirii porcusorilor orfani** - **formula comerciala de lapte pentru sugari cu varsta peste 5-6 luni**, ce contine 2-4 cereale (BEBELAC cu lapte 4 cereale, Nestle 3 cereale etc.), in primele zile se va da la intervale de 3 ore, largind paleta cu noi pietrele in rinichi! Doza alimente, introducand treptat in dieta si verdeturi, legume, fructe, hrana obisnuita de **25 mg/kg** se administreaza ca supliment in ultimele saptamani ale gestatiei, in perioada de alaptare, pierdere de calciu din oase, fiind eficace si in cazul in care porcusorul inexplicabil isi taraste piciorusele posterioare sau se deplaseaza cu acestea cu dificultate, fara sa fie ranit.

➔ **Termometru** pentru masurarea temperaturii corpului (masurare axilara/rectala) Temperatura corporala normala a porcusorului de Guinee : **37,2 - 39,5 grade C**

➔ **Betisoare** cu vata, fese sterile, forfecuta

➔ **Capsule Urinal** - in infectii/inflamatii ale tractului urinar are efecte benefice, posedea si prop. antioxidante. 1/4 sau 1/2 capsula de 2-3x/zi.

F. important! Unele antibiotice sunt toxice/fatale pentru porcusori, actioneaza asupra florei intestinale si provoaca diaree ireversibila si fatala sau o reactie alergica fatala. Detalii: <http://www.gemon.ro/antibiotice.pdf>

➔ **Produse pentru ingrijirea porcusorului de Guinee :**



- unghiera obisnuita pt. taierea gherutelor

- **piaptan metalic** cu dinti rari pe o parte si dinti desi pe cealalta, sau separat cate una din fiecare (nu se vor folosi pieptene de plastic sau perii cu dinti de sarma).



Porcusorii cu blana lunga, rasele Sheltie, Coronet, Peruvian si Angora, vor fi pieptanate zilnic sau macar de doua ori pe saptamana. La cele cu blana tip rexoid firele de par vor fi descalcite, aranjate si intretinute cu ajutorul degetelor, pentru a pastra blana in forma ei naturala.